

Es geht weiter mit konkreten Beispielen (vgl. Seiten 53, 54).

(iii) Löse $(\partial_x^2 - k^2)G(x; y) + \delta(x-y) = 0$ mit verschwindenden Randbedingungen.

(a) Fourier-transformiere Gleichung und Randbedingungen (vgl. Seite 11), mit der Annahme $G(x; y) =: f(x-y)$ [denn $\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial(x-y)}$]:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-iqx} (\partial_x^2 - k^2) f(x-y) = - \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-iqx} \delta(x-y)$$

wegen Randbedingungen $f(\pm\infty) = f'(\pm\infty) = 0$ darf man zweimal partiell integrieren

$$\Rightarrow -(q^2 + k^2) \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-iq(x-y)} f(x-y) = - \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-iqy}$$


$$\Leftrightarrow (q^2 + k^2) \tilde{f}(q) = 1 \quad \Rightarrow \quad \tilde{f}(q) = \frac{1}{q^2 + k^2}$$

(b) Rücktransformiere:

$$f(x-y) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq}{2\pi} \cdot \frac{e^{iq(x-y)}}{q^2 + k^2} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq}{2\pi} \cdot \frac{e^{iq(x-y)}}{(q-ik)(q+ik)}$$


Pole liegen bei $q = \pm ik$. Hilfsweg ist harmlos nur wenn kein exponentielles Wachstum stattfindet.

$q = +ik$
 $\Rightarrow e^{-k(x-y)} \Rightarrow$ OK für $x > y$



Genauer: $f(x-y) \stackrel{x > y}{=} 2\pi i \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{e^{-k(x-y)}}{2ik} = \frac{e^{-k(x-y)}}{2k}$

$q = -ik$
 $\Rightarrow e^{k(x-y)} \Rightarrow$ OK für $y > x$



Genauer: $f(x-y) \stackrel{y > x}{=} -2\pi i \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{e^{k(x-y)}}{-2ik} = \frac{e^{k(x-y)}}{2k}$

Diese können zusammengesetzt werden:

$$f(x-y) = G(x; y) = \frac{e^{-k|x-y|}}{2k}$$

genau wie in Aufgabe 7.2.

(iv)
$$I = \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^3}$$

Pole:
$$z^3 = -1$$

$$z = e^{i\left(\frac{\pi+2\pi n}{3}\right)} = \left\{-1, e^{i\frac{\pi}{3}}, e^{-i\frac{\pi}{3}}\right\}$$

$$z^3+1 = (z+1)(z-e^{i\frac{\pi}{3}})(z-e^{-i\frac{\pi}{3}})$$

$$= (z+1)(z^2 - z(e^{i\frac{\pi}{3}}+e^{-i\frac{\pi}{3}}) + 1)$$

$$= (z+1)(z^2 - z \cdot 2\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + 1)$$


$$= (z+1)(z^2 - z + 1) \quad \text{ok!}$$

Richtungen mit invariantem Nenner:

$$(e^{i\varphi})^3 = +1$$

$$e^{i\varphi} = e^{i\left(\frac{2\pi n}{3}\right)} = \left\{1, e^{i\frac{2\pi}{3}}, e^{-i\frac{2\pi}{3}}\right\}$$

Kontur:



Nebenweg soll für $R \rightarrow \infty$ ein Vielfaches des gesuchten Integrals liefern:

$$\int_{\beta_R} \frac{dz}{1+z^3} = \int_R^0 \frac{dx e^{i\frac{2\pi}{3}}}{1+x^3} = -e^{i\frac{2\pi}{3}} \int_0^R \frac{dx}{1+x^3}$$

$$z = x e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

Residuensatz:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{\gamma_R + \alpha_R + \beta_R} \frac{dz}{1+z^3} = (1 - e^{i\frac{2\pi}{3}}) I$$

$$= 2\pi i \cdot \frac{1}{(z+1)(z-e^{-i\frac{\pi}{3}})} \Big|_{z=e^{i\frac{\pi}{3}}}$$

Ergebnis:

$$I = \frac{1}{1 - e^{i\frac{2\pi}{3}}} \cdot \frac{2\pi i}{(e^{i\frac{\pi}{3}}+1)(e^{i\frac{\pi}{3}}-e^{-i\frac{\pi}{3}})}$$

$$= \frac{1}{1 + e^{-i\frac{\pi}{3}}} \cdot \frac{1}{1 + e^{i\frac{\pi}{3}}} \cdot \frac{\pi \cdot 2i}{(e^{i\frac{\pi}{3}} - e^{-i\frac{\pi}{3}})}$$

$$= \frac{\pi}{(1 + 2\cos\frac{\pi}{3} + 1) \sin\frac{\pi}{3}}$$

$$= \frac{\pi}{(1 + 1 + 1) \frac{\sqrt{3}}{2}}$$


$$= \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$$

(12)
$$I = \int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$$

Pol: $z = -1$.

Schlitz: Es lohnt sich, den Schlitz diesmal längs der positiven x-Achse laufen zu lassen, d.h. $\varphi \in (0, \pi)$, so dass Schlitz und Pol nicht überlappen.

Kontur:



Auf β_R : $z = x e^{i2\pi}$; $\sqrt{z} = \sqrt{x} e^{i\pi} = -\sqrt{x}$
 $\Rightarrow \int_{\beta_R} \frac{dz}{(1+z)\sqrt{z}} = \int_R^0 \frac{dx}{(1+x)(-\sqrt{x})} = \int_0^R \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$

Residuensatz: $\lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{\gamma_R + \delta_R + \beta_R} \frac{dz}{(1+z)\sqrt{z}} = 2I$

$\stackrel{!}{=} 2\pi i \cdot \frac{1}{\sqrt{e^{i\pi}}} = \frac{2\pi i}{i}$

Ergebnis: $I = \pi$.


$$I = \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{\ln(x-i)}{(x+i)^2}$$

Die Idee ist wie oben:

Pol: $z = -i$

Schlitz: Fängt bei $z = +i$ an.


Kontur*:



Ergebnis (Aufgabe 13.2):

$$I = \pi$$

* Eine andere Möglichkeit wäre




aber in Aufgabe 13.2 soll man längs des Schlitzes integrieren!

(vi)

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{\sin x}{x}$$

Pol: Es gibt keinen - die Singularität ist hebbar (vgl. Seite 55).

Trick 1: Weil es keinen Pol gibt, dürfen wir die Kontur umformen:



Trick 2:


$$\int_{\gamma_R} dz \frac{\sin z}{z} = \int_{\gamma_R} dz \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2iz}$$

$$= \int_{\gamma_R} dz \frac{e^{iz}}{2iz} - \int_{\gamma_R} dz \frac{e^{-iz}}{2iz}$$

Wähle Hilfsweg in oberer Halbebene ($e^{i(-iy)} = e^{-y}$)

Wähle Hilfsweg in unterer Halbebene ($e^{i(-iy)} = e^y$)

Residuensatz: In den einzelnen Integralen gibt es einen Pol, bei $z=0$!



$$\Rightarrow I = -(-2\pi i) \cdot \frac{1}{2i} = \underline{\underline{\pi}}$$

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{\sin^2 x}{x^2}$$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} dz \frac{1}{-4z^2} \left\{ e^{2iz} - 2 + e^{-2iz} \right\}$$

Hilfsweg oben egal Hilfsweg unten

Nur die zweite Kontur liefert einen Beitrag. Um das Residuum zu erkennen, muss man entwickeln:

$$\frac{1}{-4z^2} \{ e^{-2iz} \} = -\frac{1}{4z^2} + \frac{i}{2z} + \mathcal{O}(1)$$

$$\Rightarrow I = (-2\pi i) \cdot \frac{i}{2} = \underline{\underline{\pi}}$$